

Recomendaciones para planificar el manejo de las colmenas

Zafra de colza 2026



¿Sos productor apícola con colmenas próximas a cultivos de colza o vas a trasladar colmenas a sitios cercanos a estos cultivos?

Para la zafra 2026 se sembró **una superficie récord de colza en Uruguay (aproximadamente 400.000 ha)**. Este escenario sugiere que habrá una importante oferta de néctar y de polen para las colmenas. A continuación, se presentan recomendaciones para planificar el manejo de las colmenas de cara a la zafra de colza 2026.

1. Planificación previa

Traslado de las colmenas

Si tiene previsto trasladar colmenas a chacras con colza, hágalo **antes del inicio de la floración**. Esto permite que la colonia se desarrolle de forma gradual acompañando la floración del cultivo. Si se enfrentan repentinamente a un gran ingreso de alimento, aumenta el riesgo de enjambrazón.

Evaluá la capacidad operativa

Antes de comenzar la zafra, cada empresa debería analizar las siguientes variables:

- Disponibilidad de mano de obra, vehículos y tiempo.
- Disponibilidad de material en condiciones adecuadas para comenzar la zafra.
- Las condiciones climáticas previstas. Estas pueden disminuir los días de trabajo en las colmenas y dificultar el acceso a los apiarios.
- Tiempo que llevará hacer el recorrido por todos los apiarios de interés.

Esta planificación es clave para definir un manejo acorde a las posibilidades reales de trabajo.

Considerá el riesgo de enjambrazón

La colza es un cultivo que favorece el desarrollo de las colonias, pero también puede aumentar significativamente la enjambrazón. Su ocurrencia depende de múltiples factores como disponibilidad de alimento, superficie de colza, escalonamiento de la floración, distancia entre el apiario y el cultivo, genética de la colonia, edad de la reina y manejo realizado por el apicultor, entre otros.

En función de la evaluación de estos factores y la experiencia previa en cuanto a los niveles de enjambrazón de colmenas en colza, cada apicultor definirá las medidas de manejo para minimizar eventos de este tipo.

Definí el objetivo productivo

Antes de comenzar la floración es importante definir cuál será el objetivo principal:

- **Producción de miel**
- **Multipliación de colmenas.**

Este objetivo condicionará los manejos posteriores.

2. Preparación de las colmenas

Actualmente existe una gran variabilidad entre y dentro de los apiarios. Algunas colonias presentan poblaciones muy importantes, mientras que otras mantienen poblaciones y reservas más ajustadas. Además, durante los 20 a 30 días previos a la floración, las colonias continuarán consumiendo reservas, por lo que es importante prever la disponibilidad de alimento.

Incentivo alimenticio

Si el objetivo es iniciar la floración con colonias más fuertes, puede realizarse un incentivo alimenticio.

El objetivo es simular un ingreso continuo de néctar mediante suplementación hasta el comienzo de la floración.

Se recomienda comenzar al menos cuatro semanas antes de la floración, administrando:

- 1 a 1,5 litros de jarabe (azúcar:agua 2:1) con promotor (0,5%);
- al menos una aplicación semanal, ajustando la cantidad al consumo de la colonia.

Si al finalizar el período de incentivo queda jarabe almacenado en los panales se recomienda rallarlo para mantener el estímulo alimenticio y evitar residuos del suplemento en la miel que posteriormente será cosechada.

Como en este período prácticamente no existe ingreso natural de polen, es necesario suministrar proteínas para sostener el desarrollo de la cría. Se recomienda mantener disponibilidad continua de tortas proteicas (50-70 g, según la población y consumo).

Las colonias más fuertes responderán más rápidamente al incentivo, por lo que requerirán visitas más frecuentes.

Manejo sanitario

Antes del inicio de la floración (fines de julio-principios de agosto), aplicar formulaciones registradas de ácido oxálico en tiras de cartón, respetando la dosis y el tiempo de permanencia indicados por el fabricante.

3. Manejo durante la floración

La respuesta de las colonias dependerá en gran medida de las condiciones climáticas. Si las temperaturas son favorables, la gran superficie de colza implantada permitirá un importante crecimiento de las colonias y una buena producción de miel.

Redistribución de material vivo

Como forma de disminuir la fiebre de enjambrazón y maximizar la producción, a los 25-30 días después del inicio de la floración, las colonias más fuertes podrán donar abejas nodrizas y marcos con cría madura para reforzar colonias más débiles (siempre que estén sanas). Esto permitirá tener una mayor proporción de colonias aptas para la multiplicación o cosecha.

Si el objetivo es producir miel, colocar alzas generosamente y utilizar correctamente el poncho para ajustar el espacio en función del crecimiento esperado. Considerar el tiempo hasta la próxima visita y las perspectivas climáticas. En períodos cálidos, una colonia bien poblada puede completar con miel más de una media alza en 8-10 días.

Debido a que la miel de colza cristaliza rápidamente, los panales deben cosecharse apenas la miel esté madura y extraerse dentro de las siguientes 24 horas, evitando que cristalice dentro del panal.

Si el objetivo es multiplicar las colonias, también se sugiere agregar material generosamente, y coordinar la logística para realizar los manejos de multiplicación en período con disponibilidad de zánganos maduros.

En todos los casos cuando las colonias comiencen a desarrollarse, retirar las rejillas excluidoras (en quienes las utilizan), ya que esto ayuda a disminuir el riesgo de enjambrazón.

Durante este período, las colonias producen abundante cera, por lo que es un buen momento para intercalar láminas de cera en las medias alzas y disponer luego de panales obrados para las floraciones siguientes.

Al final de la floración, es importante dejar reservas nutricionales, principalmente si no se visualizan otras floraciones en el corto plazo.

Aunque el objetivo productivo se defina antes de la zafra, es importante reevaluarlo durante la floración y ajustarlo según:

- las condiciones del tiempo;
- la respuesta de las colonias;
- la disponibilidad operativa de la empresa.

4. Manejo luego de la floración

Después del período de floración de la colza, y considerando los eventos de mortandad registrados durante 2025, se recomienda aumentar la frecuencia de las visitas al apiario para detectar oportunamente cualquier problema y adoptar las medidas de manejo que correspondan.